

TEST DI SCREENING PER ADHD – ETÀ EVOLUTIVA

Scala di risposta: 0 = Mai | 1 = A volte | 2 = Spesso

- | | | | |
|--|-----|-----|-----|
| 1. Fatica a mantenere l'attenzione durante le attività scolastiche | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 2. Si distrae facilmente in presenza di stimoli esterni | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 3. Commette errori di distrazione nei compiti | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 4. Ha difficoltà a portare a termine le attività iniziate | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 5. Sembra non ascoltare quando gli si parla direttamente | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 6. Evita o rifiuta attività che richiedono impegno mentale prolungato | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 7. Perde frequentemente oggetti necessari alle attività | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 8. Dimentica attività o consegne quotidiane | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 9. Si muove spesso anche quando dovrebbe restare seduto | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 10. Ha difficoltà a stare seduto a lungo | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 11. Corre o si arrampica in situazioni inappropriate | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 12. Fatica a giocare o svolgere attività in modo tranquillo | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 13. È spesso "in movimento" o agisce come se fosse spinto da un motore | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 14. Parla eccessivamente | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 15. Risponde prima che la domanda sia completata | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 16. Ha difficoltà ad attendere il proprio turno | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 17. Interrompe o si intromette nelle attività degli altri | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 18. Mostra impulsività nelle decisioni | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |

Punteggio totale (0–36): _____

Interpretazione: _____

Range di punteggio – interpretazione orientativa (punteggio massimo: 36)

0–11: nella norma

12–23: area di attenzione

24–36: sospetto clinico di ADHD

Nota: il presente strumento ha esclusivamente finalità di screening orientativo e non consente la formulazione di diagnosi. I risultati devono essere interpretati da un professionista sanitario qualificato nell'ambito di una valutazione clinica complessiva. La diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD) può essere formulata esclusivamente mediante valutazione specialistica secondo i criteri diagnostici vigenti.