

TEST DI SCREENING PER IL DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

ETÀ EVOLUTIVA – FASCIA 7–11 ANNI

Scala di risposta: 0 = Mai | 1 = A volte | 2 = Spesso

- | | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 1. Qualità della comunicazione sociale reciproca | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 2. Comprensione delle regole sociali implicite | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 3. Contatto oculare e linguaggio non verbale | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 4. Condivisione di interessi con i pari | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 5. Capacità di cooperazione nel gioco | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 6. Difficoltà nel gioco di gruppo | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 7. Presenza di interessi ristretti | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 8. Rigidità cognitiva o comportamentale | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 9. Resistenza ai cambiamenti | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 10. Comportamenti ripetitivi | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 11. Sensibilità sensoriale | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 12. Regolazione emotiva | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 13. Adattamento al contesto scolastico | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 14. Gestione delle frustrazioni | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 15. Affaticamento sociale | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |
| 16. Necessità di supporto adulto nei contesti sociali | 0 ■ | 1 ■ | 2 ■ |

Punteggio totale (0–32): _____

Interpretazione: _____

Range di punteggio – interpretazione orientativa (punteggio massimo: 32)

0–9: assenza di indicatori clinicamente significativi

10–17: presenza di indicatori aspecifici – area di attenzione

18–32: presenza di indicatori compatibili con sospetto clinico

Nota: il presente strumento ha esclusivamente finalità di screening orientativo e non consente la formulazione di diagnosi. L'interpretazione dei risultati deve avvenire da parte di un professionista sanitario qualificato, nell'ambito di una valutazione clinica complessiva. La diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico può essere formulata esclusivamente mediante valutazione specialistica secondo i criteri diagnostici vigenti.